



BRESKVA, KAJSIJA I ŠLJIVA

TEHNOLOGIJA ISHRANE BRESKVE, KAJSIJE I ŠLJIVE

Breskva je jedna od najosetljivijih biljaka na prisustvo hlora i koncentraciju soli. Snabdevenost hranivima i vodom u velikoj meri utiče na rezultate prinosa. Breskva umereno usvaja vodu, ali ukoliko je snabdevanje vodom i hranljivim materijama dobro breskva počinje brzo i obilno da rađa. Osetljiva je prekomerne količine azota.

Kajsija ima umerenije zahteve za hranivima. Osetljiva je na strukturu zemljišta, zahteva dobru aeraciju jer je korenov sistem osetljiv na nedostatak vazduha. Kajsija je osetljiva na suvišak kalijuma, ali odgovarajućim količinama i kontinuiranim snabdevanjem kalijumom stablo kajsije postaje čvršće, izuzetno bogato cveta i daje visok prinos.

Šljiva dobro reaguje na povećan sadržaj humusa u zemljištu, uspeva i na kalcifikovanom pesku ili kalcifikovanom zemljištu, uz navodnjavanje, ali može da se gaji i na peskovitom i glinovitom zemljištu. Što se tiče snabdevanja hranljivim materijama treba obratiti pažnju prvenstveno na azot N, kalijum K, kalcijum Ca i magnezijum Mg

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE		
Vreme primene	Mineralno đubrivo	Količina
Rano proleće	YaraMila™ Cropcare 8-11-23	250-400 kg/ha
Pre pupljenja	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	200-400 kg/ha

PRIHRANJIVANJE ZASADA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA		
Vreme primene	Mineralno đubrivo	Količina
Intenzivan rast izdanaka, mali plodovi	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	200 kg/ha
Pre potpune veličine ploda (na pesku)	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	200 kg/ha

PRIHRANJIVANJE ZASADA SISTEMOM KAP PO KAP		
Vreme primene	Mineralno đubrivo	Količina - g/nedelja/stablo
Od pupljenja do kraja cvetanja	Ferticare™ 14-11-25	5-10
	YaraLiva™ Calcinit	2-3
Za vreme rasta ploda	Ferticare™ 24-8-16	10-140
	YaraLiva™ Calcinit	6-9
Od početka zrenja do berbe*	Ferticare™ 10-5-26	10-20
Sredinom avgusta jedanput	Ferticare™ 24-8-16	25-40

*Fertirigacija se preporučuje najkasnije do sredine jula, i kod kasnijih sorti





FOLIJARNA PRIHRANA			
Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom			
Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Do završetka cvetanja	Bolje zamećanje, preventiva nedostatka mikroelemenata	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%
Posle zamećanja i dok su plodovi mladi	Preventiva nedostatku kalcijuma Ca (gorke pege), bolja kondicija useva	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	0,3-0,7% 0,7-1% (min.3-4 puta)
Nalivanje plodova	Dopuna ishrane kalijumom za bolji kvalitet plodova i obojenost	Ferticare™ 10-5-26	0,5 - 0,7%
Od sredine avgusta, ili posle berbe	Otpornost na mraz, rezerva hraniva	Ferticare™ 24-8-16	0,5 - 1%
Proba mešanja se mora vršiti kod svakog novog kombinovanja sa pesticidima! Preventivno i u slučaju pojave nedostatka gvožđa (Fe- hloroza) koristiti YaraVita™ Rexolin Q40.			

