



JAGODA

TEHNOLOGIJA ISHRANE JAGODA NA OTVORENOM POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

U zemljište, pre rasađivanja, uneti kompleksno granulirano mineralno đubrivo bez hlora

YaraMila™ Cropcare

200-400 kg/ha, peletirano ili granulirano organsko đubrivo Fertor ili Siforga (750 - 1500 kg/ha) kao i neki insekticid (Galation, Rovocid ili Foxim 1 kg/100m²). Trake za navodnjavanje postaviti ispod folije, rupe za sadnju (6 - 8 cm) bušiti preko folije. Dan pre sadnje parcelu navlažiti.

Prilikom rasađivanja živić staviti u rupu tako da 3-4 zelena lista budu van folije. Sadnicu dobro pritisnuti. Posle rasađivanja, ukoliko se radi o manjoj površini ručno zaliti rastvorom

Ferticare™ 15-30-15 u koncentraciji od 0,2 - 0,3% (20-30 grama na 10 litara vode) i to pola litre (0,5 l) po živiću. Veće površine prilikom prvog navodnjavanja preko sistema kap po kap tretirati rastvorom **Ferticare™ 15-30-15**, 30-35 kg/ha.

Navodnjavati svaki dan u 2 navrata (pre i posle podne) od po 12 sata, odnosno do normalne vlažnosti (80- 85% PVK).

Đubrivom **Ferticare™ 15-30-15** nastaviti prihranu 3-4 dana po sadnji i to 15g/m²/nedeljno (ili ručno koncentracija 0,2-0,3%).

Posle, kada se jagode prime i isprave, ići sa **Ferticare™ 14-11-25** 10-15g/m²/nedeljno.

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	750-1500 kg/ha	YaraMila™ Cropcare	250-500 kg/ha

FERTIRIGACIJA

Period	Vrsta đubriva	kg/ha	Napomena
Sadnja, zaliti	Ferticare™ 15-30-15	25-40	0,2% rastvor
Ukorenjavanje (jesen)	Ferticare™ 15-30-15 YaraLiva™ Calcinit	50 15-30	Jedan tretman
Intenzivan porast (jesen)	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	40-60 30	Nedeljno
Ukorenjavanje (proleće)	Ferticare™ 15-30-15 YaraLiva™ Calcinit	50 15-30	Jedan tretman
Do zametanja prvih plodova (proleće)	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	40-60 30	Nedeljno
Intenzivan rast plodova	Ferticare™ 10-5-26 Krista™ K Plus	30-50 30-50	Nedeljno
Pred zrenje i tokom berbe	Ferticare™ 10-5-26	40-60	Nedeljno, prema potrebi u podeljenim dozama
Nakon berbe, do kraja vegetacije	Ferticare™ 24-8-16 Krista™ K Plus	20-30 5-8	Dva do tri tretmana

FOLIJARNA PRIHRANA

Razvojni stadijum	Vrsta đubriva	Koncentracija %	Cilj tretmana
Nakon sadnje i tokom razvoja rozete	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%	pospešivanje rasta
Od početka cvetanja, razvoj ploda	Ferticare™ 10-5-26	0,5 - 0,7%	poboljšanje kvaliteta i zametanja
Nakon berbe	Ferticare™ 14-11-25	0,5 - 1%	kondicioniranje za prinos u sledećoj godini

Preventivno i u slučaju pojave nedostatka gvožđa (Fe- hloroza) koristiti **YaraVita™** Rexolin Q40.

