



KRASTAVAC KORNIŠON

TEHNOLOGIJA ISHRANE KRASTAVCA KORNIŠONA

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1-2 t/ha	YaraMila™ Cropcare	300-500 kg/ha

*Napomena: Kod Špalira sa širim međurednim rastojanjem doza za 1m² odgovara 1 dužnom metru Špalira

Kornišon ima izražene zahteve za azotom. Potrebe za azotom su veće u početku stvaranja ploda. Nedostatak azota prouzrokuje slabiji rast i deformaciju plodova koji su krivi i prema vrhu suženi. Biljka reaguje na nedostatak azota odbacivanjem (abortacijom) novih plodova. U slučaju suviška azotom, biljka je bujnija, takođe odbacuje plodove i dolazi do pojave simptoma prouzrokovanih viškom soli u zemljištu. Značaj fosfora kod kraslavca je prvenstveno izražen tokom proizvodnje rasada i u periodu razvoja i rasta korena, zato se nedostatak fosfora uglavnom ispoljava dok su biljke mlade. Kraslavac zahteva ravnomernu i stalnu snabdevenost kalijumom. Nedostatak izaziva smetnje u rastu, višak sprečava pravilno usvajanje Ca i Mg. Kalijumova komponenta u đubrivima mora biti bez hlora, na koji je kraslavac izrazito osetljiv. Kalcijum je element čiji je nedostatak sve češće prisutan u proizvodnji kraslavca. Nepovoljni uslovi sredine, nedostatak provetranja, visok nivo soli, često prouzrokuju pojavu nedostatka kalcijuma. U slučaju njegovog nedostatka simptomi se uočavaju na mladim listovima i vrhovima izdanaka.

PRIHRANA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina	Napomena
Nakon ukorenjavanja	YaraLiva™ Calcinit	100-150	1 tretman
	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	60-100	
Cvetanje	YaraLiva™ Calcinit	60-400	1 tretman
	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	80-100	
Berba	YaraMila™ Cropcare 11-11-21 uz dodatak azota do potrebnog nivoa*	100-130	7-8 nedelja, svake druge nedelje
Berba u jesen	YaraMila™ Cropcare 11-11-21	60-100	2 tretmana


*Napomena za azot odnosi se na prihranu useva čistim azotnim đubrivima (KAN, AN) do potrebnog nivoa. Količina zavisi od stanja useva i snabdevenosti zemljišta. Za više detalja obratite se našoj stručnoj službi.

FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	Kg/1000l vode za zalivanje
Zalivanje sadnja	Ferticare™ 15-30-15	0,2%
Nakon ukorenjavanja, početak intenzivnog rasta	Ferticare™ 14-11-25	0,7-1,1
	Amonijum nitrat	0,3-0,5
Za vreme intenzivnog rasta	Ferticare™ 24-8-16	0,7-0,9
	Krista™ K Plus	0,2-0,4
Konstantno, za vreme letnje berbe	Ferticare™ 14-11-25	0,7-1,1
	Amonijum nitrat	0,3-0,5
Na kraju letnje berbe	Ferticare™ 24-8-16	0,7-1
	Krista™ K Plus	0,3-0,4

Neophodna je primena **YaraLiva™ Calcinit** 1-1,5kg/1000l jednom nedeljno, u 1-2 navrata. Odnos N/K treba prilagoditi vrstama! Ako je vreme kišovito, potrebna je manja količina vode ali veća doza. Jednom nedeljno je potrebno primeniti **Krista™ MgS**.

Intenzivna tehnologija gajenja sa fertirigacijom se preporučuje za intenzivnu proizvodnju sa sistemom navodnjavanja kap po kap i visoke prinose 100-200 t/ha (10-20 kg/m²). Kod fertirigacije treba uzeti u obzir i količinu padavina. Ako su količine padavina značajne, hraniva treba dodavati sa manjom količinom vode i povećanom koncentracijom. Kod dužeg zahlađenja moraju se smanjiti količine hraniva s obzirom da se njihovo usvajanje smanjuje i usporava. Tada raste značaj i uloga folijarne prihrane sa već intenzivnim tretmanima zaštite. Nedeljnu dozu đubriva, koja se daju u obliku hranljivog rastvora, treba primeniti iz 2 do 3 dela u zavisnosti od tipa zemljišta. Jednokratna doza rastvora ne bi trebala da bude viša od 6 l/m². Na peskovitom zemljištu, za vreme vrućih letnjih dana, potrebna je svakodnevna fertirigacija.





FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom

Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje do cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%
Nakon cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Poboljšanje zamećanja plodova Prevenција nedostatka Ca	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Tokom berbe i u jesen	Bolji kvalitet plodova	Ferticare™ 10-5-26	0,5 - 0,7%

