



KRASTAVAC

TEHNOLOGIJA ISHRANE KRASTAVCA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Krastavac je jedna od najzahtevnijih i najosetljivijih povrtarskih kultura i svaka greška utiče na prinos i kvalitet. Koren krastavca je izuzetno osetljiv na povećanu zaslanjenost i hlór, zato lako dolazi do nekroze korena i njegovog gubitka. Uzrok osetljivosti su veoma tanke korenove dlačice, plitko rasporedene, koje imaju velike potrebe za vazduhom i vodom, s tim da snabdevanje mora da bude ravnomerno, jer reaguju na prekomerno zalivanje, bez dovoljno vazduha.



© Yara

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	50-100 g/m ²	YaraMila [™] Cropcare	40 - 100 g/m ²

PRIHRANJIVANJE KRASTAVCA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina	Napomena
Nakon ukorenjavanja	YaraLiva [™] Calcinit	30 g/m ²	Jedan tretman
Intenzivan rast	YaraMila [™] Cropcare 11-11-21	40 g/m ²	Jedan tretman
Rast prvih plodova	YaraMila [™] Cropcare 11-11-21	10 g/m ²	Jednom nedeljno
	YaraLiva [™] Calcinit	15 g/m ²	
Tokom berbe	YaraMila [™] Cropcare 11-11-21	20 g/m ²	Svaki 10-14 dana
	Amonijum Nitrat	15 g/m ²	
Jesenja berba	YaraMila [™] Cropcare 11-11-21	15 g/m ²	Svaki 10-14 dana
	YaraLiva [™] Calcinit	15 g/m ²	

Preporučuje se plastenicima bez sistema kap po kap, sa navodnjavanjem mikro-rasprskivačima.

FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	g/100 m ² /nedeljno
Rasad	Ferticare [™] 15-30-15	Na 7-10 dana 0,2%
Sadnja	Ferticare [™] 15-30-15	500
	YaraLiva [™] Calcinit	200
Intenzivni rast, cvetanje do opterećenja glavnog stabla	Ferticare [™] 14-11-25	500
	Krista [™] K Plus	100
	YaraLiva [™] Calcinit	200
Opterećenje glavnog stabla do berbe	Ferticare [™] 14-11-25	1000
	YaraLiva [™] Calcinit	300
Tokom berbe	Ferticare [™] 10-5-26	1000
	Amonijum Nitrat	150
	Ferticare [™] 24-8-16	500
Jesenja berba	Krista [™] K Plus	600
	Ferticare [™] 10-5-26	1100
	Amonijum Nitrat	150
	Ferticare [™] 24-8-16	500
	Krista [™] K Plus	600

.Preporučuje se kod gajenja u plastenicima sa sistemom navodnjavanja kap po kap, za postizanje prinosa 10-20 kg/m²

U slučaju nedovoljne bujnosti, rasta i razvoja biljaka, nedostatak azota, povremeno prihraniti sa

Ferticare[™] 24-8-16 u dozi 3-5 g/m². Ako postoje problemi sa zabarivanjem i nakon određenih perioda, radi obnavljanja korenovog sistema u vegetaciji, povremeno prihraniti sa

Ferticare[™] 15-30-15 u dozi 3-5 g/m². Za dopunu ishrane magnezijumom dodati **Krista**[™] MgS ili **Krista**[™] MAG u količini 0,3-0,5 g/m² nedeljno, od sadnje do sredine perioda berbe.





FOLJARNA PRIHRANA			
Prihranu preko lista izvodi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom			
Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje do cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%
Intenzivan porast i cvetanje	Rast i razvoj vegetativne mase Bolja kondicija useva Prevenција nedostatka Ca	Ferticare™ 24-8-16 YaraLiva™ Calcinit	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Plodonošenje	Pospešivanje naliivanja plodova	Ferticare™ 10-5-26	0,7 - 0,1%

