



KROMPIR

TEHNOLOGIJA ISHRANE KROMPIRA



OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1- 2 t/ha	YaraMila™ ili YaraMila™ Cropcare	300 600 kg/ha

Za rane sorte (kraća vegetacija) primenjuju se manje doze.
Ako ne koristite organska đubriva u prolećnoj obradi uneti 100-300 kg/ha KAN-a ili AN-a u zavisnosti od sadržaja humusa i pH.

PRIHRANJIVANJE KROMPIRA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
Usev visine 15-25 cm u intenzivnom porastu	AN ili KAN YaraMila™ Cropcare	250-400 kg/ha 200-400 kg/ha
Pred cvetanje, krtole formirane	YaraMila™ Cropcare	200-400 kg/ha

FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	kg/ha
Usev u intenzivnom porastu 15 cm i više	Ferticare™ 24-8-16 Krista™ K Plus	200-300 200-300
Pred cvetanje, krtole formirane	Ferticare™ 10-5-26 Krista™ K Plus	150-200 150-250

*100 kg **Krista™** K Plus se možete zameniti sa 40 kg **AN-a** i 90 kg **Krista™** **SOP-a**.
Navedene količine đubriva možete podeliti u više doza.

FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom

Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon nicanja dok usev ne dosegne visinu 15 cm	Ferticare™ 14-11-25	0,7 %
Intenzivni porast do kraja cvetanja	Ferticare™ 24-8-16	0,7-1 %
Nalivanje krtola poboljšanje kvaliteta	Ferticare™ 10-5-26	0,7-1 %

