



# KUPUSNJAČE

## TEHNOLOGIJA ISHRANE KUPUSNJAČA

Za kupusnjače je karakteristična velika potreba za fosforom i to nakon rasađivanja, naročito kod ranih vrsta. Kupusnjače namenjene za korišćenje u svežem stanju potreno je snabdeti većim količinama azota. Kalijum ima značajnu ulogu u razvoju glavice, ruže, poboljšava njihov kvalitet. Uslov za dobro skladištenje zimskih vrsta je visok nivo suve materije, za šta je potreban visok nivo kalijuma.



### OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

| Vreme primene   | Mineralno đubrivo         | Količina      |
|---|---------------------------|---------------|
| Startno đubrenje u proleće  | <b>YaraMila™ Cropcare</b> | 400-500 kg/ha |
| Za useve kraće vegetacije i snabdevenijim zemljištima primeniti manje doze.<br>Na zemljištima sa izraženim manjkom kalijuma dodati granulisani KALIJUM SULFAT 0-0-50 u dozi od 150-200 kg/ha. |                           |               |

### PRIHRANJIVANJE KUPUSNJAČA VEGETACIJE DO 80 DANA

| Vreme prihrane  | Mineralno đubrivo   | Količina                              |
|---|---|---------------------------------------|
| Pre sadnje ili tokom ukorenjavanja  | AN ili KAN  | 100-250 kg/ha                         |
| Razvoj rozete   | <b>YaraMila™ Cropcare 11-11-21</b><br>Po potrebi AN ili KAN | 150-300 kg/ha<br>100-200 kg/ha        |
| Početak uvećanja glavice<br>35-45 dana nakon sadnje   | <b>YaraMila™ Cropcare</b><br>Po potrebi AN ili KAN          | 150 kg/ha po potrebi<br>150-200 kg/ha |
| * AN ili KAN upotrebiti ako je usev vegetacije preko 70 dana. Za kupusnjače kraće vegetacije u većini slučajeva nema veće potrebe za azotom u kasnijim fazama. Dozu azota odrediti na osnovu opšteg stanja useva. |   |                                       |

### PRIHRANJIVANJE KUPUSNJAČA VEGETACIJE 90-110 DANA

| Vreme prihrane  | Mineralno đubrivo   | Količina                      |
|---|---|-------------------------------|
| Pre sadnje ili tokom ukorenjavanja                      | AN ili KAN  | 100-250 kg/ha                 |
| Razvoj rozete<br>ili 35 dana nakon sadnje               | <b>YaraMila™ Cropcare</b><br>AN ili KAN                     | Do 300 kg/ha<br>150-300 kg/ha |
| Početak uvećanja glavice<br>ili 55-65 dana nakon sadnje | <b>YaraMila™ Cropcare 11-11-21</b><br>AN ili KAN po potrebe | 200 kg/ha<br>150-300 kg/ha    |





#### PRIHRANJIVANJE KUPUSNJAČA VEGETACIJE DUŽE OD 120 DANA

| Vreme primene                               | Mineralno đubrivo                                  | Količina kg/ha                 |
|---|--|--------------------------------|
| Pre sadnje ili tokom ukorenjavanja          | AN ili KAN   | 150-250 kg/ha                  |
| Razvoj rozete                               | <b>YaraMila™</b> Cropcare<br>AN ili KAN po potrebi | Do 300 kg/ha<br>150-250 kg/ha  |
| Glavice formirane                           | <b>YaraMila™</b> Cropcare<br>AN ili KAN po potrebi | 200 kg/ha<br>150-300 kg/ha*    |
| Glavica u rastu ili 80-90 dana nakon sadnje | <b>YaraMila™</b> Cropcare<br>AN ili KAN po potrebi | 150-250 kg/ha<br>150-200 kg/ha |

Kupusnjače duge vegetacije dobro reaguju na poslednju prihranu CROPCARE đubrivima, posebno kupusi za skladištenje.

#### FOLIJARNA PRIHRANA

| Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom |                            |               |
|---|----------------------------|---------------|
| Period  | Vrsta đubriva              | Koncentracija |
| Nakon sadnje  | <b>Ferticare™</b> 14-11-25 | 0,5 %         |
| Razvoj rozete   | <b>Ferticare™</b> 24-8-16  | 0,5-0,7 %     |
| Razvoj glavice  | <b>Ferticare™</b> 10-5-26  | 0,7-1 %       |

