



# LUKOVI

## TEHNOLOGIJA ISHRANE CRNOG LUKA, PRAZILUKA, BELOG LUKA



OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE			
Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORG	1-2 t/ha	YaraMila™ YaraMila™ Cropcare	Do 500 kg/ha

PRIHRANJIVANJE CRNOG LUKA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA		
Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina kg/ha
2-3 lista	AN ili KAN	200 kg/ha
Razvoj rozete 5 listova	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN <sup>+</sup>	200-300 kg/ha 200-300 kg/ha
Početak formiranja glavice, 7 listova	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN	200-300 kg/ha 150-250 kg/ha

Obratiti pažnju na prihrane crnog luka azotnim đubrivima da ne dođe do zaostajanja u porastu ili kašnjenjem do smanjenja kvaliteta sklađištenja.

PRIHRANJIVANJE PRAZILUKA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA		
Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina kg/ha
Ukorenjavanje	AN ili KAN	200 kg/ha
Intenzivni porast	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN <sup>+</sup>	200-300 kg/ha 200-300 kg/ha
Debljanje stabla jednom ili dva puta zavisno od dužine vegetacije	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN po potrebe <sup>+</sup>	150-250 kg/ha 150 kg/ha

  

PRIHRANJIVANJE BELOG LUKA GRANULISANIM ĐUBRIVIMA		
Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina kg/ha
2-3 lista	AN ili KAN	200 kg/ha
Razvoj rozete	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN <sup>+</sup>	200 kg/ha 150-100 kg/ha
Nalivanje glavice	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN po potrebe <sup>+</sup>	200 kg/ha 150 kg/ha

Azotna đubriva (AN i KAN), koja se preporučuju u prihrani lukova, mogu da se zamene sa YaraLiva™ Calcinit dubrovom (količina se duplira). Pogotovo se preporučuje za zemljišta sa nedostatkom kalcijuma.



FOLIJARNA PRIHRANA		
Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon nicanja	Ferticare™ 14-11-25	0,5 %
Razvoj lisne rozete	Ferticare™ 24-8-16	0,7 %
Razvoj glavice	Ferticare™ 10-5-26	1 %

