



# MALINA I KUPINA

## TEHNOLOGIJA ISHRANE MALINE I KUPINE



OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE				
Vreme primene	Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
Proleće ili kraj zime	FERTOR ili SIFORGA	1 - 1,5 t/ha	<b>YaraMila™</b> Cropcare 8-11-23 AN ili KAN	250-500 kg/ha 50 kg/ha (aktivne materije)
Cvetanje			AN ili KAN	100 kg/ha (aktivne materije)

FOLIJARNA PRIHRANA		
Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom		
Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Kretanje vegetacije do cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,3-0,5 %
Cvetanje i 2 nedelje nakon toga	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	0,5-0,7 %
Kasnije do berbe	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	0,5-0,7 %
Proba mešanja se mora vršiti kod svakog novog kombinovanja sa pesticidima! Preventivno i u slučaju pojave nedostatka gvožđa (Fe- hloroza) koristiti <b>YaraVita™</b> Rexolin Q40.		

