



PAPRIKA

TEHNOLOGIJA ISHRANE PAPRIKE NA OTVORENOM POLJU

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1-2 t/ha	YaraMila™ Cropcare	250-300 kg/ha

*Napomena: Kod špalira sa širim međurednim rastojanjem doza za 1m² odgovara 1 dužnom metru špalira



PRIHRANJIVANJE PAPRIKE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Konstantno snabdevanje hranivima može se postići u zasadima sa navodnjavanjem rasprskivačima i primenom granuliranih đubriva. Svrshodno je đubrivo rasuti pre navodnjavanja i po mogućnosti plitko inkorporirati.

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
Do početka cvetanja	YaraLiva™ Calcinit	200
Intenzivni rast	YaraMila™ 11-11-21	200
Posle prve dve-tri berbe ili ponavljati svakih 15-20 dana do početka septembra	YaraMila™ 11-11-21 + Čisto azotno đubrivo*	150 100-200
Pre bojenja plodova odnosi se na začinsku, obojene i kalifornija tipove paprike	YaraMila™ 8-11-23 + Amonijum nitrat	200-300

*od čistih azotnih đubriva preporučujemo KAN ili AN

FERTIRIGACIJA

Nedeljne doze đubriva za ishranu useva paprike na otvorenom polju kod kojih je primenjeno osnovno đubrenje. Doze su izražene u kg/nedeljno, a za prinos od 50-70 t/ha

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	kg/ha nedeljno	Napomena
Sadnja	Ferticare™ 15-30-15	25	0,2% zaliti odmah nakon sadnje
Tokom ukorenjavanja	Ferticare™ 15-30-15	50	U slučaju da je zemljište suvo
Pre cvetanja	YaraLiva™ Calcinit Ferticare™ 14-11-25	50-100 50	Odjednom ili iz dva puta
Za vreme otvaranja prvih cvetova	Ferticare™ 14-11-25	60	Jednom
Tokom razvoja i rasta plodova	YaraLiva™ Calcinit Ferticare™ 24-8-16 ili Ferticare™ 14-11-25 + Amonijum Nitrat	60 60 60+10	3 puta, jednom nedeljno 4-5 nedelja, nedeljno u 2-3 dela
Tokom berbe	Ferticare™ 10-5-26 Amonijum Nitrat	40 25	3-4 nedelje, nedeljno u 2-3 dela
Sredina avgusta početak septembra	Krista™ K Plus Amonijum Nitrat	30 20	2-3 nedelje, nedeljno u 2 dela

Učestalost zalivanja određuje podelu nedeljnih doza. Rastvor se može primeniti u dozama po 20-50 kg/ha, odnosno, nedeljno se đubri prosečno dva do tri puta. Na peskovitom zemljištu količina đubriva se deli na manje doze, s tim da se zalivanje i đubrenje može vršiti svaki dan. Za obnavljanje korenovog sistema povremeno ili svakih 30 dana treba primeniti **Ferticare™ 15-30-15** do 25 kg/ha.

FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom

Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%
Zametanje plodova	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Prevenција nedostatka Ca - obavezno primenjivati nakon oplodnje 3-5 puta radi prevencije pojave suve truleži vrha ploda	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Intenzivan porast do berbe	Stimulacija rasta. Prevenција nedostatka azota	Ferticare™ 24-8-16	0,5 - 0,7%
Tokom berbe	Kvalitet plodova Stimulacija rasta	Ferticare™ 10-5-26 Ferticare™ 24-8-16	0,5% 0,5%