



# PAPRIKA

## TEHNOLOGIJA ISHRANE PAPRIKE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Pošto je paprika veoma osetljiva biljka i snabdevanje sa vodom i hranljivim materijama zahteva veliku pažnju. Paprika ima relativno plitak korenov sistem, koji ima slabiju moć usvajanja.



© Yara

### OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
Bez organskih đubriva	-	<b>YaraMila™ Cropcare</b>	50 - 60 g/m <sup>2</sup>
FERTOR ili SIFORGA	50-100 g/m <sup>2</sup>	<b>YaraMila™ Cropcare</b>	50 - 60 g/m <sup>2</sup>

### PRIHRANJIVANJE PAPRIKE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Nakon ukorenjavanja do berbe	<b>YaraMila™ Cropcare</b> 11-11-21 <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	20 - 40 g/m <sup>2</sup> 10 - 15 g/m <sup>2</sup>
Tokom berbe	<b>YaraMila™ Cropcare</b> 11-11-21 Amonium Nitrat	30 - 50 g/m <sup>2</sup> 20 - 30 g/m <sup>2</sup>

Prihranu izvoditi na svakih 10-14 dana pred zalivanje. Ukupno upotrebjena količina đubriva ne bi trebala da bude veća od 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>.

### FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	g/100 m <sup>2</sup> /nedeljno
Sadnja	<b>Ferticare™</b> 15-30-15	400
Do cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	500 100-200
Nakon cvetanja kad se zametnu prvi plodovi	<b>Ferticare™</b> 24-8-16 <b>Krista™ K Plus</b> <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	400 250 200
Prvi plodovi razvijeni 1/2 veličine	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>Krista™ K Plus</b> <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	1000 400 200
Pred berbu za debljanje prvih plodova	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>Krista™ K Plus</b> <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	1200 400-600 200
Nakon prve berbe	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>Krista™ K Plus</b> <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	800 500 200
Tokom berbe	<b>Ferticare™</b> 10-5-26 <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	1600 200

Po potrebi, radi obnavljanja korena povremeno dodati **Ferticare™** 15-30-15 3 g/m<sup>2</sup> svakih 10-15 dana. Takođe, ako je potrebno povećati bujnost i održati vegetativni porast dodavati **Ferticare™** 24-8-16 3-5 g/m<sup>2</sup> nedeljno u vreme intenzivnog rasta.

- Ako uočite probleme sa nedostatkom kalijuma, na postojeći recept, tokom nekoliko nedelja, dodati 5-8 g/m<sup>2</sup> **Krista™ K PLUS** ili **Krista™ SOP**.

- Za dopunu ishrane magnezijumom dodati **Krista™ MgS** ili **Krista™ MAG** u količini 0,3-0,5 g/m<sup>2</sup> nedeljno, od sadnje do sredine perioda berbe.

U slučaju predozirane ishrane ili viška elemenata u zemljištu možete takođe korigovati ishranu biljaka, a u pravcu izbacivanja đubriva sa određenim elementima iz receptura

### FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom		
Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje do cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,3 - 0,5%
Nakon cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>YaraLiva™ Calcinit</b>	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Tokom berbe	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	0,5 - 0,7%