



PARADAJZ

TEHNOLOGIJA ISHRANE PARADAJZA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Paradajz u zaštićenom prostoru ima izražene zahteve za hranljivim materijama. Na visok prinos (u dužoj vegetaciji 15-30 kg/m²; u kraćoj vegetaciji 6-15 kg/m²) i kvalitet se može računati samo ako obezbedimo optimalnu, kvalitetnu i izbalansiranu ishranu paradajza tokom cele vegetacije.

Yara đubriva imaju optimalno postavljene odnose hranljivih elemenata, veoma jednostavno možete upravljati svojim usevom tokom cele vegetacije. Pojedine primećene greške možete lako otkloniti korekcijama u ishrani, tako što ćete na postojeću preporuku dodati određenu vrstu i količinu đubriva kao npr.:

- Nedostatak azota N! Ako primetite da biljke nemaju dovoljno vegetativne mase i želite da povećate bujnost useva (nedovoljan razvoj i porast) ili su biljke preopterećene plodovima nakon oplodnje (posebno za poludeterminantne i generativne tipove), dodajte 3-5 g/m²

Ferticare™ 24-8-16 bogat azotom, na već postojeću preporuku. Ovakvu dopunu ponavljati jednom u 7-15 dana zavisno od potreba i stanja useva.

- U intenzivnom gajenju dolazi do narušavanja strukture zemljišta, vazdušno-vodnog režima i problema sa razvojem korena. Za obnavljanje korena i podršku cvetnim granama u drugom delu vegetacije, po potrebi (na svakih 10-20 dana) dodajte 3-5 g/m² **Ferticare™ 15-30-15** koji je bogat fosforom.

- Ako uočite probleme sa nedostatkom kalijuma, na postojeći recept, tokom nekoliko nedelja, dodati 5-8 g/m² **Krista™ K PLUS** ili **Krista™ SOP**.

- Za dopunu ishrane magnezijumom dodati **Krista™ MgS** ili **Krista™ MAG** u količini 0,3-0,5 g/m² nedeljno, od sadnje do sredine perioda berbe.

- Kalcijum je u tabeli iskazan u nižim dozama, jer ga uglavnom ima dovoljno u zemljištu. Ukoliko je manjak u zemljištu, nizak pH zemljišta ili je primećen nedostatak u prethodnim sezonama, povećati dozu za 100 %.

OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Ogransko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	150-250 g/m ²	YaraMila™ Cropcare	50-100 g/m ²

FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	g/100 m ² /nedeljno
Sadnja	Ferticare™ 15-30-15	400
1. cvetna grana	Ferticare™ 14-11-25	900
	YaraLiva™ Calcinit	120
2-4. cvetna grana	Ferticare™ 14-11-25	1400
	Krista™ K Plus	400
	YaraLiva™ Calcinit	100
5-6. cvetna grana	Ferticare™ 14-11-25	1300
	Krista™ K Plus	600
	YaraLiva™ Calcinit	100-150
Tokom berbe	Ferticare™ 10-5-26	1800
	YaraLiva™ Calcinit	100-150

U slučaju predozirane ishrane ili viška elemenata u zemljištu možete takođe korigovati ishranu biljaka, a u pravcu izbacivanja đubriva sa određenim elementima iz receptura.





FOLIJARNA PRIHRANA			
Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom			
Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje do cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	Ferticare™ 14-11-25	0,3 - 0,5%
Nakon cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Prevenција nedostatka Ca	Ferticare™ 14-11-25 YaraLiva™ Calcinit	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Tokom berbe	Pospešivanje naliivanja plodova Prevenција nedostatka K Poboljšanje kvaliteta i ujednačeno zrenje	Ferticare™ 10-5-26	0,5 - 0,7%
Proba mešanja se mora vršiti kod svakog novog kombinovanja sa pesticidima!			

