



# PARADAJZ

## TEHNOLOGIJA ISHRANE PARADAJZA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Paradajz u zaštićenom prostoru ima izražene zahteve za hranljivim materijama. Na visok prinos (u dužoj vegetaciji 15-30 kg/m<sup>2</sup>; u kraćoj vegetaciji 6-15 kg/m<sup>2</sup>) i kvalitet se može računati samo ako obezbedimo optimalnu, kvalitetnu i izbalansiranu ishranu paradajza tokom cele vegetacije.

Yara đubriva imaju optimalno postavljene odnose hranljivih elemenata, veoma jednostavno možete upravljati svojim usevom tokom cele vegetacije. Pojedine primećene greške možete lako otkloniti korekcijama u ishrani, tako što ćete na postojeću preporuku dodati određenu vrstu i količinu đubriva kao npr.:

- Nedostatak azota N! Ako primetite da biljke nemaju dovoljno vegetativne mase i želite da povećate bujnost useva (nedovoljan razvoj i porast) ili su biljke preopterećene plodovima nakon oplodnje (posebno za poludeterminantne i generativne tipove), dodajte 3-5 g/m<sup>2</sup>

**Ferticare™ 24-8-16** bogat azotom, na već postojeću preporuku. Ovakvu dopunu ponavljati jednom u 7-15 dana zavisno od potreba i stanja useva.

- U intenzivnom gajenju dolazi do narušavanja strukture zemljišta, vazdušno-vodnog režima i problema sa razvojem korena. Za obnavljanje korena i podršku cvetnim granama u drugom delu vegetacije, po potrebi (na svakih 10-20 dana) dodajte 3-5 g/m<sup>2</sup> **Ferticare™ 15-30-15** koji je bogat fosforom.

- Ako uočite probleme sa nedostatkom kalijuma, na postojeći recept, tokom nekoliko nedelja, dodati 5-8 g/m<sup>2</sup> **Krista™ K PLUS** ili **Krista™ SOP**.

- Za dopunu ishrane magnezijumom dodati **Krista™ MgS** ili **Krista™ MAG** u količini 0,3-0,5 g/m<sup>2</sup> nedeljno, od sadnje do sredine perioda berbe.

- Kalcijum je u tabeli iskazan u nižim dozama, jer ga uglavnom ima dovoljno u zemljištu. Ukoliko je manjak u zemljištu, nizak pH zemljišta ili je primećen nedostatak u prethodnim sezonama, povećati dozu za 100 %.

### OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Ogransko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	150-250 g/m <sup>2</sup>	<b>YaraMila™</b> Cropcare	50-100 g/m <sup>2</sup>

### FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	g/100 m <sup>2</sup> /nedeljno
Sadnja	<b>Ferticare™ 15-30-15</b>	400
1. cvetna grana	<b>Ferticare™ 14-11-25</b>	900
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	120
2-4. cvetna grana	<b>Ferticare™ 14-11-25</b>	1400
	<b>Krista™ K Plus</b>	400
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	100
5-6. cvetna grana	<b>Ferticare™ 14-11-25</b>	1300
	<b>Krista™ K Plus</b>	600
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	100-150
Tokom berbe	<b>Ferticare™ 10-5-26</b>	1800
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	100-150

U slučaju predozirane ishrane ili viška elemenata u zemljištu možete takođe korigovati ishranu biljaka, a u pravcu izbacivanja đubriva sa određenim elementima iz receptura.





FOLIJARNA PRIHRANA			
Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom			
Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon sadnje do cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,3 - 0,5%
Nakon cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Prevenција nedostatka Ca	<b>Ferticare™</b> 14-11-25 <b>YaraLiva™</b> Calcinit	0,5 - 0,7% 0,5 - 1%
Tokom berbe	Pospešivanje naliivanja plodova Prevenција nedostatka K Poboljšanje kvaliteta i ujednačeno zrenje	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	0,5 - 0,7%
Proba mešanja se mora vršiti kod svakog novog kombinovanja sa pesticidima!			

