



# SALATA

## TEHNOLOGIJA ISHRANE SALATE

Salata je biljka koja je, zbog plitkog korenovog sistema, veoma osetljiva na zaslanjenost, hlor, poremećenost vazdušno-vodnog režima zemljišta i povećan sadržaj pesticida. Obratiti posebnu pažnju na optimalnu snabdevenost kalcijumom, jer će u ekstremnim uslovima teško podnositi nedostatak kalcijuma, čiji se simptomi ispoljavaju kao nekroza rubova lista smeđe boje.



OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE			
Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	50 g/m <sup>2</sup>	<b>YaraMila</b> <sup>TM</sup> Cropcare <b>YaraLiva</b> <sup>TM</sup> Calcinit	30 - 60 g/m <sup>2</sup> 5 - 10 g/m <sup>2</sup>

PRIHRANJIVANJE SALATE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA		
Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
Do početka obrazovanja glavice, 2-3 prihrane, po celoj površini ili u redove	<b>YaraMila</b> <sup>TM</sup> Cropcare 11-11-21 <b>YaraLiva</b> <sup>TM</sup> Calcinit	15 - 30 g/m <sup>2</sup> 10 - 20 g/m <sup>2</sup>

Preporučuje se ako se usev navodnjavanja mikrorasprskivačima. Prihranu izvoditi pred zalivanje na svakih 10-14 dana, a ukupno dva do tri puta tokom vegetacije. Granule **YaraMila**<sup>TM</sup> Cropcare đubriva i **YaraLiva**<sup>TM</sup> Calcinit ne oštećuju biljke u smislu progorevanja na mestu kontakta sa lisnom površinom. Sva zalivanja vršiti u juturnjim, prepodnevним satima da se usev na vreme osuši.

FERTIRIGACIJA			
FERTIRIGACIJA SALATA SA MEKOM I SREDNJE ČVRSTOM STRUKTUROM LISTOVA, A RASTRESITOM LISNATOM ROZETOM (PUTERICA, LOLO TIPOVI, BATAVIA, HRASTOV LIST)			
Period	Vodotopivo đubrivo	Koncentracija	Doza
Rasađivanje	<b>Ferticare</b> <sup>TM</sup> 15-30-15	0,15%	3-4 g/m <sup>2</sup>
Ukorenjavanje	<b>Ferticare</b> <sup>TM</sup> 14-11-25	0,10%	6-8 g/m <sup>2</sup>
	<b>YaraLiva</b> <sup>TM</sup> Calcinit	0,05%	2-4 g/m <sup>2</sup>
Razvoj rozete	<b>Ferticare</b> <sup>TM</sup> 24-8-16	0,06%	6-8 g/m <sup>2</sup>
	<b>YaraLiva</b> <sup>TM</sup> Calcinit	0,05%	2-4 g/m <sup>2</sup>
Pred formiranje glavice	<b>Ferticare</b> <sup>TM</sup> 10-5-26	0,6%	6-10 g/m <sup>2</sup>

Količinu vodotopivog đubriva potrebnu u pojedinoj fazi razvoja rasporediti na 2-3 zalivanja.





### FERTIRIGACIJA SALATA SA ČVRSTOM STRUKTUROM LISTOVA KOJE OBRAZUJU GLAVICU (ICEBERG)

Period	Vodotopivo đubrivo	Koncentracija	Doza
Rasadivanje	<b>Ferticare™</b> 15-30-15	0,15%	3-4 g/m <sup>2</sup>
Ukorenjavanje	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,10%	6-8 g/m <sup>2</sup>
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	0,05%	2-4 g/m <sup>2</sup>
Razvoj rozete	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	0,06%	8 g/m <sup>2</sup>
	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	0,05%	2-4 g/m <sup>2</sup>
	<b>Krista™</b> K Plus	0,06%	6 g/m <sup>2</sup>
Pred formiranje glavice	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	0,6%	6-10 g/m <sup>2</sup>

Količinu vodotopivog đubriva potrebnu u pojedinoj fazi razvoja rasporediti na 2-3 zalivanja.

### FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom

Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Nakon ukorenjavanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,5 %
Razvoj rozete	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	0,5 - 0,7 %
Početak formiranja glavice	<b>Ferticare™</b> 10-5-26 (1-2 puta*)	0,5 - 0,7 %

\*Nije preporučljivo folijarno tretirati lisnate kulture 3-4 nedelje pred berbu.

