



# STONE SORTE GROŽĐA

## TEHNOLOGIJA ISHRANE VINOVE LOZE - STONE SORTE GROŽĐA



### MELIORATIVNO ĐUBRENJE PRILIKOM ZASNIVANJA VINOGRADA

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	2,5 t/ha	<b>YaraMila™</b> Cropcare	400-800 kg/ha

\*ukoliko je izražen nedostatak kalijuma u zemljištu dodati granulisani KALIJUM SULFAT 100-300 kg/ha

### OSNOVNO ĐUBRENJE U JESEN STONIH SORTI

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1,5-2,5 t/ha	<b>YaraMila™</b> Cropcare 8-11-23	200-500 kg/ha

### PRIHRANJIVANJE STONIH SORTI GRANULISANIM ĐUBRIVIMA U VEGETACIJI

Proleće pred kretanje vegetacije ili ako je vegetacija već krenula		Pred ili tokom cvetanja		Početak intenzivnog nalivanja bobica	
Mineralno đubrivo	Količina			Mineralno đubrivo	Količina
<b>YaraMila™</b> Cropcare	150-300 kg/ha	<b>YaraMila™</b> Cropcare 11-11-21	100-200 kg/ha	<b>YaraMila™</b> Cropcare 11-11-21	100-200 kg/ha

### FERTIRIGACIJA

Period	Vrsta đubriva	Količina
Kretanje vegetacije	<b>Ferticare™</b> 15-30-15	100-200 kg/ha
Nakon kretanja vegetacije do cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	150-200 kg/ha
	<b>Krista™</b> K Plus	100 kg/ha
Nakon cvetanja porast bobica	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	150-250 kg/ha
	<b>Krista™</b> K Plus	100 kg/ha
Pred promenu boje bobica	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	150-250 kg/ha
	<b>Krista™</b> K Plus	100-200 kg/ha

### FOLIJARNA PRIHRANA

Vreme primene	Vrsta đubriva	Doza kg/ha	Koncentracija %
Početak vegetacije do cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	3-5	0,3-0,5
Nakon cvetanja	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	3-5	0,3-0,7
Razvoj bobica	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	3-5	0,5-0,8
Razvoj bobica	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	3-5	0,5-0,8

Preventivno i u slučaju pojave nedostatka grožđa (Fe- hloroza) koristiti **YaraVita™** Rexolin Q40.

