



SUNCOKRET

TEHNOLOGIJA ISHRANE SUNCOKRETA

Savremeni hibridi suncokreta imaju visoke zahteve za hranljivim materijama zbog njihovog visokog potencijala za prinos. Suncokret zahteva malo azota i veliku količinu kalijuma, pa se zato preporučuju đubriva sa visokim sadržajem kalijuma. Pored azota, fosfora i kalijuma važnu ulogu za prinos i kvalitet suncokreta imaju optimalne količine sumpora, bora, magnezijuma i mangana.

Osnovno i startno đubrenje


Obaviti u pripremi zemljišta pre setve, uneti najmanje pola potreba za fosforom i kalijumom. Zajedno sa setvom ostatak fosfora i kalijuma i startnu dozu azota. Upotrebljavajte **YaraMila™** đubriva kompleksna, granulirana đubriva sa mikroelementima (**YaraMila™ 13-13-21**) u dozi 200-350 kg/ha. Ukoliko imate rezultate hemijske analize zemljišta, odaberite odgovarajuću kombinaciju za Vašu parcelu. Ukoliko niste radili analizu zemljišta, primenite đubrivo sa standardnim odnosom hraniva za usev suncokreta radi zadovoljenja potreba useva za hranivima, posebno kalijumom.

Prihrana useva

Prihrana se obavlja tokom kultivacije u istom proходу. Obratiti pažnju na količinu primenjenog azota! U uslovima prekomerne ishrane azotom opasnost od pojave gljivičnih oboljenja je veća. Primeniti 20-40 kg/ha čistog azota. U godinama sa više padavina primeniti manje doze, a u sušnim veće.

Folijarno đubrenje

Za opšte zadovoljenje potreba useva i otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata koristite **Ferticare™** kristalna, vodotopiva đubriva, 3-5 kg/ha, max. koncentracija 1,5%. Folijarnu prihranu vršiti zajedno sa pesticidima. Prva primena u fazi 6-8 lista, a druga prihrana, zavisno od klirensa prskalnice, može se raditi do pred cvetanje.



	U osnovnoj obradi i startnom đubrenju tokom setve	U fazi 6-8 listova Folijarna prihrana	U fazi 10-12 listova Prihranjivanje azotnim đubrivima tokom kultivacije	Kasniji folijarni tretmani
YaraMila™	200-350 kg/ha*			
	50-70 kg/ha** čistog azota		20-40 kg/ha** čistog azota	
Ferticare™		3-5 kg/ha		3-5 kg/ha

* Kod prihrane organskim đubrivom količinu P i K smanjujemo za 20-30 %.
 Pri proizvodnji konzumnog suncokreta, preporučuje se upotreba mineralnog đubriva bez hlora **YaraMila™** Cropcare 6-12-24.
 ** Kada su predusevi leguminoze, treba smanjiti količinu azota. Ako se primeni veća količina azota nego što je potrebno, biljke postaju osetljive na pojavu gljivičnih oboljenja

